

Actualizando la distribución de la Pajonalera Pico Recto *Limnocittes rectirostris* en la provincia de Entre Ríos, Argentina

Marcos Babarskas y Rosendo Fraga

Here we provide updated information concerning the distribution of Straight-billed Reedhaunter *Limnocittes rectirostris* in Entre Ríos province, Argentina. New records, including one of nesting, are presented. The species had not been seen in the province for 60 years. This rare furnariid has a very restricted and local distribution in Argentina, where it is known from 14 localities around the Paraná River delta. As reported elsewhere in the literature, this bird is a sawgrass *Eryngium* specialist.

La Pajonalera Pico Recto *Limnocittes rectirostris* es un raro furnárido que se encuentra en el sudeste de Brasil, sur y este de Uruguay, y el sur de Entre Ríos y nordeste de Buenos Aires en la Argentina¹². La especie está catalogada como “en peligro” en la Argentina⁷ y como “casi amenazada” en Sudamérica^{3,4}. En la Argentina se conocía sólo un registro antiguo para la provincia de Entre Ríos: Estación ferroviaria Libertador Gral. San Martín (ex Paranacito), ferrocarril Gral. Urquiza, Departamento Islas del Ibicuy⁶ (en el Delta del Paraná). Las localidades citadas en este artículo se indican consecutivamente en la Fig. 1.

Se detallan a continuación nuevos registros de *L. rectirostris* para cuatro localidades del Departamento Islas del Ibicuy en la provincia de Entre Ríos (en cada cita se observó un ejemplar).

- 8 kilómetros al Este de Ceibas (33°29'S 58°45'W) el 22 de enero de 1991 (M. Pearman *et al. in litt.*) y dos registros de 1993 (M. Pearman *in litt.*).
- Villa Paranacito (33°43'S 58°39'W) el 14 de abril de 1991 (M. Pearman *in litt.*) y en mayo del mismo año (F. Lambert *in litt.*).
- Ruta provincial 45 (33°40'S 58°43'W) el 25 de julio de 1995 (M. Pearman *in litt.*) y en agosto del mismo año (M. Pearman y E. Abadie *in litt.*).

Nuestras observaciones: cruce de la ruta provincial 45 y las vías del ferrocarril Gral. Urquiza, entre las estaciones Brazo Largo y Libertador Gral. San Martín (aprox. 33°50'S 59°02'W), el 7 de septiembre de 1996, un ejemplar posado sobre una inflorescencia seca de una planta de carda o caraguatá, *Eryngium* sp. El ave fue localizada con ayuda playback de sus vocalizaciones. En la vegetación del lugar (en una superficie de

aproximadamente dos hectáreas) predominaba *Eryngium* sp. (probablemente *E. pandanifolium*) acompañada por chilcas (*Baccharis* spp.), cortadera (*Cortaderia selloana*), y especies arbóreas como sauce (*Salix* spp.), ceibo (*Erythrina cristagalli*) y curupí (*Sapium haematospermum*). Nuevamente fue registrada en la misma localidad el 15 de noviembre de 1997. En esa oportunidad también se halló un nido en construcción. El nido se encontraba a tres metros de una zanja con agua y a 10 m de la ruta provincial 45 (asfaltada). Estaba sobre una planta de *Eryngium*, a 62 cm del suelo con respecto a la parte inferior del nido, siendo las medidas externas del mismo de 20 cm de alto y 13 de ancho. La orientación cardinal de la boca de entrada era hacia el norte. Los materiales de construcción del nido eran hojas secas de *Eryngium* sp., *Scirpus* sp., y en menor medida fragmentos no identificados de gramíneas. La planta que contenía el nido medía 1,95 m de alto y 2,2 m de diámetro en la parte superior.

Es probable que la escasa información conocida para Entre Ríos, se deba a la pobre prospección de ambientes potencialmente aptos para *L. rectirostris*. Para la provincia de Buenos Aires se conocen datos en al menos nueve localidades muy cercanas entre sí.

- Lima⁵, partido de Zárate.
- Potrero de las Burras¹⁰, partido de Campana.
- Reserva Natural Otamendi⁹ (34°13'S 58°54'W), partido de Campana.
- Establecimiento Forestal “Las Carabelas”⁸ (aprox. 34°10'S 58°45'W), partido de Campana.
- Reserva privada El Talar de Belén (citada en Chebez⁵ por error involuntario como “Talón de Belén” y observada además por M. Babarskas), partido de Escobar.




Figura 1. Mapa del sur de la provincia de Entre Ríos y nordeste de Buenos Aires, Argentina. Los números indican donde fue avistada *L. rectirostris*: 1. 8 kilómetros al Este de Ceibas. 2. Villa Paranacito. 3. Ruta provincial 45. 4. Estación ferroviaria Libertador Gral. San Martín. 5. Cruce de la ruta provincial 45 y las vías del ferrocarril Gral. Urquiza. 6. Lima. 7. Campana. 8. Reserva Natural Otamendi. 9. "Las Carabelas". 10. Reserva El Talar de Belén. 11. Cañada El Cazador. 12. Benavidez. 13. Villa La Ñata. 14. Rincón de Milberg.

- Cañada El Cazador⁵, partido de Escobar.
- Benavidez¹¹, partido de Tigre (sitio destruido en 1989, M. Pearman *in litt.*).
- Villa La Ñata⁵ (en base a observaciones de J. Leiberman com. pers.), partido de Tigre.
- Rincón de Milberg², partido de Tigre.

La diferencia de información entre ambas provincias, podría explicarse por dos razones principales: por un lado, en el nordeste de Buenos

Aires existe comparativamente con el sudeste de Entre Ríos, una mayor cantidad de vías de acceso terrestre a las cercanías del Delta del río Paraná; y por otro lado, la afluencia de observadores de aves, principalmente de la ciudad de Buenos Aires y alrededores, es mayor.

En visitas efectuadas por los autores al sur de Entre Ríos, se practicaron otros experimentos de playback en diferentes localidades. Los mismos se realizaron en septiembre de 1996 en lugares donde crecían plantas de *Eryngium*, el ambiente frecuentado por *L. rectirostris*. Las localidades muestreadas (en el Departamento Islas del Ibicuy) fueron: cercanías de Ibicuy, Estación Libertador Gral. San Martín, ruta provincial 45 (en dos sitios), ruta nacional 12 (en dos ocasiones, a 11 y 15 Km al sur de Ceibas respectivamente). El 15 de noviembre de 1997 el playback nuevamente se practicó en ocho oportunidades en el mismo departamento: Estación Libertador Gral. San Martín, ruta provincial 45 (en dos sitios), ruta nacional 12 entre Ceibas y la Estación Médanos (en tres ocasiones, a 10, 12 y 15 Km al este de Médanos respectivamente). Muestreos sistemáticos en la Reserva Natural Otamendi indicaron que *L. rectirostris* respondió al playback, cuando estaba presente, en 10 de 13 intentos (76,9 %)¹. Por tanto creemos que estos resultados indicarían que la especie es muy local en Entre Ríos.

Con estos nuevos registros se actualiza la información sobre *L. rectirostris* en la provincia de Entre Ríos, ofreciendo la segunda mención de nidificación de la especie en esta provincia. El primer y único dato publicado de Entre Ríos data de noviembre de 1931, donde J. Daguerra había colectado un ejemplar y hallado un nido en un ambiente con presencia de *Eryngium*, en la localidad citada más arriba⁶. Concluimos que a pesar de ser una especie rara, luego de 60 años sigue presente en la región. Fuera de esto, nada sabemos sobre el posible efecto de la fragmentación del hábitat en el status de conservación de la especie.

Agradecimientos

Agradecemos a Nadine Renaudeau d'Arc, Ernesto Betze y Pedro Flombaum por la colaboración ofrecida durante las prospecciones. A Cecilia Burigotto por la confección del mapa. A Mark Pearman por facilitarnos gentilmente sus observaciones.

Referencias

1. Babarskas, M. (1998) Requerimientos de hábitat de la Pajonalera Pico Recto,

- Limnortyx rectirostris* (Aves: Furnariidae). Tesis de Licenciatura, Universidad de Buenos Aires.
2. Canevari, M., Canevari, P., Carrizo, G. R., Harris, G., Rodríguez Mata, J. & Straneck, R. (1991) *Nueva guía de las aves argentinas*, I y II. Buenos Aires: Fundación Acindar.
 3. Collar, N. J., Gonzaga, L. P., Krabbe, N., Madroño Nieto, A., Naranjo, L. G., Parker T. A. & Wege, D. C. (1992) *Threatened birds of the Americas: the ICBP/IUCN Red Data Book*. Cambridge, UK: International Council for Bird Preservation.
 4. Collar, N. J., Crosby, M. J. & Stattersfield, A. J. (1994) *Birds to watch 2: the world list of threatened birds*. Cambridge, UK: BirdLife International (Conservation Series 4).
 5. Chebez, J. C. (1994) *Los que se van. Especies argentinas en peligro*. Buenos Aires: Ed. Albatros.
 6. Daguerre, J. B. (1933) Dos aves nuevas para la fauna argentina. *Hornero* 5: 213–215.
 7. García Fernández, J. J., Ojeda, R. A., Fraga, R. M., Díaz, G. B. & Baigún, R. J. (ed.) (1997) *Libro Rojo de Mamíferos y Aves Amenazadas de la Argentina*. Buenos Aires: FUCEMA & APN.
 8. Krapovickas, S. F. (1996) Comunidades de aves en el Delta del Paraná: parámetros ecológicos comparativos entre pajonales palustres y forestaciones comerciales. Tesis de Licenciatura. Fac. Cs. Ex. y Nat. (UBA).
 9. Krapovickas, S., Di Giacomo, A., Babarskas, M. & Di Giacomo, A. (1992) *Aves silvestres de la Reserva Natural Estricta Otamendi. Lista Sistemática*. Buenos Aires: Adm. de Parques Nacionales.
 10. Pereyra, J. A. (1938) Aves de la zona ribereña nordeste de la Provincia de Buenos Aires. *Mem. Jardín Zool. La Plata* 9: 1–304.
 11. Ricci, J. J. & Ricci, F. (1984) Nidificación de la pajonalera de pico recto (*Limnortyx rectirostris*) en Benavidez, Buenos Aires, Argentina. *Hornero* 12: 205–208.
 12. Ridgely, R.S. & Tudor, G. (1994) *The birds of South America*, 2. Austin: Univ. of Texas Press.
- Marcos Babarskas**
Administración de Parques Nacionales, Av. Santa Fe 690, (1059) Buenos Aires, Argentina.
- Rosendo Fraga**
Asociación Ornitológica del Plata, 25 de mayo 749 2do. "6", (1002) Buenos Aires, Argentina.