

Nuevos registros provinciales de *Pseudocolopteryx acutipennis* en Argentina

El Doradito Oliváceo

Pseudocolopteryx acutipennis ha sido considerado durante mucho tiempo un habitante típico de cursos de aguas y ambientes húmedos de los Andes, con esporádicos registros en tierras bajas^{1,2,6}. En Argentina Olog⁴ inicialmente lo citó para la zona andina y serrana de Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja y Córdoba, entre los 1.000 y 2.000 m. Navas³ actualizó su distribución en Argentina, dando a conocer los primeros registros para la región pampeana, estos provenientes de la zona centro-este la provincia de Córdoba. Por último, Roesler⁷ dio a conocer información detallada de las poblaciones pampeanas con nuevos registros de Córdoba, Buenos Aires y La Pampa. Aquí presentamos el primer registro documentado de *P. acutipennis* para la provincia de Santa Fe y el segundo documentado para la provincia de Corrientes.

El 12 de enero de 2008 RMJ observó y fotografió un individuo de *P. acutipennis* (Fig. 1) en la zona rural de Venado Tuerto (33°46'S 62°00'O; 112 m), dpto. General López, sur de la provincia de Santa Fe. En febrero del mismo año RMJ



Figura 1. Doradito Oliváceo *Pseudocolopteryx acutipennis* observado en la zona rural de Venado Tuerto, 12 de enero de 2008 (Ricardo Moller Jensen)



Figura 2. Doradito Oliváceo *Pseudocolopteryx acutipennis* observado en la zona de Corrientes capital, 24 de abril de 2008 (Guillermo Soterias)

visitó el área en varias oportunidades observando tanto juveniles como varios adultos. El ambiente donde se encontraban todos los individuos era un pastizal cubierto en su mayor parte por cardales de *Carduus* sp., y que se encontraba ubicado entre las margenes de un camino rural y un canal de desagüe.

Este registro, y las observaciones subsiguientes, constituirían los primeros de *P. acutipennis* para la provincia de Santa Fe⁵. Si bien no contamos con suficientes obser-

vaciones en el área es probable que la abundancia de la especie sea semejante a la presentada por Roesler⁷ para otras localidades de la región pampeana, principalmente debido a la cercanía de Venado Tuerto con las mismas (c.200 km)⁷. También es destacable que el ambiente que se observa en la zona rural de Venado Tuerto es muy similar al de dichas localidades (IR obs. pers.). Mas allá que la observación haya sido realizada en las márgenes de un canal que regularmente posee agua, el ambiente era típico de áreas donde la tierra no es utilizada para actividades agrícolas, siendo este el mismo caso que ya ha sido mencionado para el hábitat en otras regiones de Córdoba⁷.

El 24 de abril de 2008 en las márgenes de un estero en Lomas de Santana (27°28'S 58°40'O), a 15 km de la ciudad de Corrientes, provincia de Corrientes, GS observó un grupo de cuatro individuos y se logró fotografiar solo uno de los individuos (Fig. 2). El ambiente eran matorrales densos en los bordes de un área anegada.

El registro de Corrientes constituiría el segundo registro³ para dicha provincia y confirmaría la presencia actual en la misma. El hecho de que fuera un grupo de varios adultos que no fueron vueltos a observar posteriormente sugiere que se encontraba de paso por el lugar. Si bien no hay información disponible, es probable que la especie no reproduzca en la provincia, ya que ambos registros han sido realizados en fechas que podrían considerarse extremas, tanto de primavera como otoño³.

Estos registros, sumado al del ejemplar colectado en Corrientes³, contribuyen a llenar el vacío de información existente entre los extremos de la distribución geográfica de la especie. También sugieren una segunda ruta migratoria, siendo la otra propuesta la que se ubica a lo largo de los Andes hasta Colombia⁷.

Referencias

1. Fitzpatrick, J. W. (2004) Family Tyrannidae (tyrant-flycatchers). En: del Hoyo, J., Elliott, A. & Christie, D. A. (eds.) *Handbook of the birds of the world*, 9. Barcelona: Lynx Edicions.
2. Fjeldsá, J. & Krabbe, N. (1990) *Birds of the high Andes*. Copenhagen: Zool. Mus., Univ. of Copenhagen & Svendborg: Apollo Books.
3. Navas, J. R. (2002) La distribución geográfica de *Pseudocolopteryx acutipennis* (Tyrannidae) en la Argentina. *Hornero* 17: 45-48.
4. Olrog, C. C. (1979) *Nueva lista de la avifauna Argentina*. Opera Lilloana 27.
5. de la Peña, M. R. (1997) *Lista y distribución de las aves de Santa Fe y Entre Ríos*. Buenos Aires: Literature of Latin America.
6. Ridgely, R. S. & Tudor, G. (1994) *The birds of South America*, 2. Austin: University of Texas Press.
7. Roesler, I. (2009) El Doradito Oliváceo *Pseudocolopteryx acutipennis* en las pampas Argentinas: nuevos registros y comentarios sobre su



Figura 3. Mapa de registros donde fue hallado *P. acutipennis*: (a) Venado Tuerto, Santa Fe; y (b) Loma de Santana, provincia de Corrientes.

historia natural. *Cotinga* 31:
OL 1–4.

Ricardo Moller Jensen

*Foro Foto Mundo Silvestre, Calle
Río Negro N° 322, Venado Tuerto
(2600), Santa Fe, Argentina. E-
mail: ricardormj@waycom.com.ar.*

Ignacio Roesler

*Grupo FALCO, Calle 117 N° 1725,
La Plata (1900), Buenos Aires,
Argentina. E-mail:
roesler@grupofalco.com.ar.*

Guillermo Soteras

*Foro Foto Mundo Silvestre. E-mail:
nologg@gmail.com.*

Received 27 March 2008; final
revision accepted 2 September
2008 (published online 4 March
2009)
